

Intégrales impropres

-

Abdelhaq ABDELQARI

Table des matières

1	Définitions et premières propriétés	3
2	Changement de variable et intégration par parties	8
3	Intégrales des fonctions positives	10
4	Fonctions intégrables sur un intervalle quelconque de \mathbb{R}	12

Dans ce chapitre on va étendre la notion d'intégrale, déjà vue en première année, d'une fonction réelle continue sur un intervalle fermé $[a, b]$. Ici, les fonctions considérées sont des fonctions à valeurs réelles ou complexes continues et l'intégration est faite sur des intervalles du type $[a, b[$, $]a, b]$, $]a, b[$ avec a ou b qui peuvent prendre $\pm\infty$ comme valeurs.

1 Définitions et premières propriétés

Définition 1.1 — intégrale impropre. On dit que l'intégrale $\int_a^b f(t)dt$ est impropre dans les cas suivants :

1. f est non bornée sur des intervalles quelconques (bornés ou non) du type $]a, b]$ ou $]a, b[$
2. f est bornée sur des intervalles non bornés comme $] -\infty, a]$ ou $]a, +\infty[$

- **Exemple 1.1**
1. $\int_0^1 \frac{1}{t} dt$ $\int_0^{+\infty} \ln(t) dt$
 2. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t} dt$ $\int_{-\infty}^0 e^t dt$

Définition 1.2 — Convergence d'une intégrale impropre. 1. Soient $(a, b) \in \mathbb{R} \times \bar{\mathbb{R}}$, avec $a < b$ et $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{C}$ continue sur $[a, b[$.

On dit que l'intégrale impropre (ou généralisée) $\int_a^b f(t)dt$ converge (**CV**) si, et seulement si, l'application $x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ admet une limite en b^- .

Dans ce cas, on note :

$$\int_a^b f(t)dt = \lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t)dt.$$

2. Soit $(a, b) \in \bar{\mathbb{R}} \times \mathbb{R}$, $a < b$, et $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{C}$ continue sur $]a, b[$.

On dit que l'intégrale impropre (ou généralisée) $\int_a^b f(t)dt$ converge si, et seulement si, l'application $x \mapsto \int_x^b f(t)dt$ admet une limite en a^+ . En cas de convergence on note

$$\int_a^b f(t)dt = \lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^b f(t)dt$$

3. Soient $(a, b) \in \bar{\mathbb{R}} \times \bar{\mathbb{R}}$, $a < b$, $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $]a, b[$. On dit

l'intégrale impropre (ou généralisée) $\int_a^b f(t)dt$ converge si, et seulement si :

$\forall c \in]a, b[$, $\int_a^c f(t)dt$ et $\int_c^b f(t)dt$ convergent, on pose alors

$$\int_a^b f(t)dt = \int_a^c f(t)dt + \int_c^b f(t)dt$$

4. Une intégrale $\int_a^b f(t)dt$ qui ne converge pas, est dite *divergente (DV)*.

■ **Exemple 1.2** Étudier la convergence des intégrales impropres suivantes :

$$\int_0^1 \ln(t)dt \quad \int_0^{+\infty} e^{-t}dt \quad \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}}dt \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} \quad \int_1^{+\infty} \frac{1}{t}dt; \quad \int_0^{+\infty} \frac{1}{t^3}dt$$

.....

Proposition 1.3 Soit $(a, b) \in \mathbb{R} \times \bar{\mathbb{R}}$, $a < b$, et $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{C}$ continue sur $[a, b[$. $\forall c \in [a, b[$, les intégrales impropres $\int_a^b f(t)dt$ et $\int_c^b f(t)dt$ sont de même nature. Autrement dit la nature de l'intégrale ne dépend pas de la borne a.

En cas de convergence on a : $\int_a^b f(t)dt = \int_a^c f(t)dt + \int_c^b f(t)dt$. C'est la relation de Chasles.

Preuve

.....

Dans la suite du cours on se limite au cas où l'intervalle d'étude est du type, $[a, b[$ avec $(a, b) \in \mathbb{R} \times \bar{\mathbb{R}}$.

Proposition 1.4 — linéarité de l'intégrale. Soit $(a, b) \in \mathbb{R} \times \bar{\mathbb{R}}$, $a < b$, $\lambda \in \mathbb{C}$, f et g deux applications continues sur $[a, b[$ à valeurs dans \mathbb{R} ou \mathbb{C} , si $\int_a^b f$ et $\int_a^b g$ convergent, alors $\int_a^b (f + \lambda g)$ converge et on a : $\int_a^b (f + \lambda g) = \int_a^b f + \lambda \int_a^b g$

Preuve

.....

R

Il est important de s'assurer d'abord de la convergence des intégrales impropres $\int_a^b f$ et $\int_a^b g$ avant d'appliquer la linéarité.

■ **Exemple 1.4** Il suffit d'étudier les intégrales $\int_4^{+\infty} \frac{dt}{t^2-5t+6}$, $\int_4^{+\infty} \frac{1}{t-3} dt$ et $\int_4^{+\infty} \frac{1}{t-2} dt$

.....

Proposition 1.5 Soit $(a, b) \in \mathbb{R} \times \overline{\mathbb{R}}$, et soit f une application continue sur $[a, b[$ à valeurs complexes.

L'intégrale $\int_a^b f(t) dt$ converge si, et seulement si, les intégrales $\int_a^b \operatorname{Re}(f)(t) dt$ et $\int_a^b \operatorname{Im}(f)(t) dt$ convergent. Dans ce cas, $\int_a^b f(t) dt = \int_a^b \operatorname{Re}(f)(t) dt + i \int_a^b \operatorname{Im}(f)(t) dt$

Proposition 1.6 — Intégrales de référence. Soient $a > 0$ et $\alpha \in \mathbb{R}$

- $\int_a^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$ est convergente $\Leftrightarrow \alpha > 1$
- $\int_0^a \frac{dt}{t^\alpha}$ est convergente $\Leftrightarrow \alpha < 1$ } ce sont les intégrales de **Riemann**.
- $\int_0^1 \ln t dt$ est convergente.
- L'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} dt$ est convergente $\Leftrightarrow \alpha \in \mathbb{R}_+^*$.

Preuve

.....

R

Soit $a < b$ deux réels,

- $\int_b^{+\infty} \frac{1}{(t-a)^\alpha} dt$ est convergente $\Leftrightarrow \alpha > 1$.
- $\int_a^b \frac{1}{(t-a)^\alpha} dt$ est convergente $\Leftrightarrow \alpha < 1$.

3 Intégrales des fonctions positives

Proposition 3.1 — Une condition nécessaire et suffisante de convergence. Soit $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $a < b$ et $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}_+$ continue sur $[a, b[$.

$\int_a^b f$ converge si et seulement si la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ est majorée. Autrement dit,

$$\int_a^b f \text{ converge} \Leftrightarrow \exists M > 0, \forall x \in [a, b[: \int_a^x f \leq M$$

Dans ce cas on a : $\int_a^b f(t)dt = \text{Sup} \left\{ \int_a^x f(t)dt \text{ quand } x \text{ décrit } [a, b[\right\}$

·
·
·
·
·

Corollaire 3.2 $\int_a^b f$ diverge si et seulement si la fonction $\lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t)dt = +\infty$.

Proposition 3.3 — Critère de majoration. Soit f et g deux fonctions continues sur $[a, b[$ à valeurs positives et telles que $f \leq g$ sur $[a, b[$.

1. Si $\int_a^b g$ est convergente alors $\int_a^b f$ est aussi convergente et on a $\int_a^b f(t)dt \leq \int_a^b g(t)dt$.
2. Si $\int_a^b f$ est divergente alors $\int_a^b g$ est aussi divergente.

Preuve

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

R

La proposition ci-dessus reste valable si l'inégalité $0 \leq f \leq g$ est vérifiée uniquement sur un intervalle $[c, b[\subset [a, b[$.

■ **Exemple 3.1** Étudier la convergence des intégrales impropres suivantes : $\int_0^{+\infty} \frac{t \ln t}{1+t^4}$ et $\int_0^1 \frac{1}{\sin t}$ ■

·
·
·
·
·
·
·

Proposition 3.4 — convergence par équivalence. Soit f et g deux fonctions continues sur $[a, b]$ à valeurs positives.

Si $f \sim g$ au voisinage de b alors $\int_a^b f$ et $\int_a^b g$ sont de même nature.

Preuve

.....

■ **Exemple 3.2** Etudier la convergence des intégrales impropres suivantes :

$$\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(t^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} ; \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1 + e^t)(1 - e^{-t})} ; \int_0^1 \frac{t \ln(1 - t)}{1 + t} dt$$

■

.....

Proposition 3.5 — convergence par négligeabilité. Soit f et g deux fonctions continues par morceaux sur $[a, b]$ à valeurs positives.

Si $f = o(g)$ alors $\left(\int_a^b g \text{ converge} \Rightarrow \int_a^b f \text{ converge} \right)$

Preuve

.....

Définition 4.3 Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue sur un intervalle quelconque I . La fonction f est dite intégrable sur I , si l'intégrale $\int_I f(t)dt$ est absolument convergente.

Proposition 4.2 — Linéarité de l'intégrabilité. Soit $f, g : [a, b[\rightarrow \mathbb{C}$ deux fonctions intégrables sur $[a, b[$.

Alors $\forall \lambda \in \mathbb{K}, f + \lambda g$ est intégrable sur I . L'ensemble des fonctions continues et intégrables sur I est un espace vectoriel.

Preuve

.

.

.

.

Proposition 4.3 — Domination. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ et $\phi : I \rightarrow \mathbb{R}^+$ deux fonctions continues sur I telles que :

$$\forall t \in I, |f(t)| \leq \phi(t)$$

Si ϕ est intégrable sur I , alors f est intégrable sur I .

Preuve

.

.

.

.

Proposition 4.4 — négligeabilité. Soit $f, g : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues sur $[a, b[$. Si g est intégrable sur $[a, b[$ et si $f \underset{b^-}{=} o(g)$, alors f est intégrable sur $[a, b[$.

Preuve

.

.

.

.

.

■ Exemple 4.2 .

.

.

.

■